

Prodif OD


Prodif OD

Yeni teknoloji,yağ bazlı süspansiyon konsantre formülasyon tipinde yeni, etkili, ekolojik ve ekonomik, larvasittir. Prodif OD, karasinek larvalarına karşı etkili olup, larva ölümleri şeklinde gerçekleşir.

Karasinekler

Prodif OD ile çöp konteynerleri, çöplükler, gübrelikler ve diğer karasinek üremesine elverişli organik atıkların ilaçlanması, karasinek kontrolünde başarıyı arttıracaktır. Çöp konteynerlerindeki çöpün günlük alınmasına rağmen, konteynerlerin dip kısmındaki birkaç santimetrelilik balçık/çamurumsu tabakada binlerce karasinek larvası bulunmaktadır.

Bundan dolayı konteynerin dip kısmına ulaşacak şekilde yapılan Prodif OD uygulaması hedef alanındaki karasinek problemini sonlandıracaktır.



Karasineğin Yaşam Gücü


Hayat çemberlerinin tamamlanmasında sıcaklık faktörü önemli rol oynar.

°C	16	18	20	25	30	35
GÜN	44	27	20	16	10	35

Uygun çevre koşullarında; bir dişi karasinekten 5 hafta içinde 76 milyar karasinek meydana gelir. Larvalar 12°C - 47°C arasında gelişir.

Biyolojik etkinlik

Karasinek larvaları gübre veya organik atık yüzeyinin 10-15 cm altında bulunur. Bu alana, larvasitleri ulaştırmak çoğu zaman mümkün değildir. Prodif OD, karasinek yumurtalarının bulunduğu üst katmanda yumurtalar üzerinde ovisit etki göstererek karasinek problemini daha yumurta döneminde önler. Prodif OD, karasinek yumurtaları üzerinde %100 etkindir.



Gübre yığınının beş mikro iklimi

- A Yüzey katmanı (10 - 15 cm) kuru ve düşük ısı.
- B Larva gelişimi için ideal bölge.
- C Fermentasyon bölgesi: sinek larvasının gelişmesi için fazla sıcak
- D Sinek larvasının görülmesi olası bölge.
- E Yere temas sebebiyle soğuk bölge, sadece pupa



PROSİMO
DOĞANIN,İÇİNDEN

Neden Yağ Bazlı Formülasyon


- ☑ Buharlaşmayı engeller.
- ☑ İlacın etkinliğini artırır.
- ☑ Sıcak bölgelerde etkinliği artırır.
- ☑ Güneş ışığına karşı dayanıklılığı artırır.
- ☑ Aktif maddeyi sararak ısıdan korunmasını sağlar.
- ☑ Yayıcı ve yapılıtırıcı özelliğini göstererek yayılır, yapışır.



Formülasyon İçeriği

% 20 Diflubenzuron
LARVASİT

OD YAĞ BAZLI SÜSPANSİYON KONSANTRE



Kullanılacağı Zararlı organizmalar

Zararlı Türü	Uygulama Alanı ve Şekli	Sulandırma Oranı	Uygulama Miktarı	Uygulama Dozu	Uygulama Aralığı
Karasinek Larvası	Çöplükler ve Gübrelik alanlar	250 ml ürün + 399.75 L su ile karıştırılır	4 L karışım m ²	0.50 g a.i./m ²	28 Gün

Prodif Od Karasinek Üreme Alanlarında Tabloda Belirtildiği Oranlarda Sulandırılarak Kullanılmalıdır.

Kullanım Şekli

- ☑ Önce seyrelticiyi ekleyip sonra ürünü ekleyiniz.
- ☑ Karasinek uygulama alanlarında metrekaresine en az 1 litre karışım uygulanmalıdır.
- ☑ Karasinek larvaları gübrelüğün yüzeyinden en az 8-10 cm altında olup, Prodif OD 'yi bu alana ulaştırdığınızdan emin olunuz.

Kullanırken ve Depolanırken Dikkat Edilecek Hususlar

- ☑ Direk güneş ışığından uzak tutunuz.
- ☑ Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- ☑ Çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzakta 25C ± 2' de saklayınız.
- ☑ Kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılan yerlerde saklayınız.