

1 Ad. Mum Blok Ağırlığı 5 Kg'dır

Zararlı Türüne Göre Karışım ve Uygulama Oranları:

Tabloda belirtilen oranlarda kullanılır.

Zararlı Türü ve yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama oranı	Uygulama aralığı
Sıçan	Mesken ve mesken çevresi Tek kullanımlık ve dökülmeyecek şekilde istasyon içerisinde	düşük popülasyonda, 10 m'de bir , yoğun popülasyonda 5 m'de bir istasyona uygulayınız.	İstasyon başına 50-150 gr. (5-10 Adet) yem	Periyodik aralıklarla istasyonlar kontrol edilerek zararlı varlığına göre uygulama tekrarlanır

Uygulama Şekli:

1. Yem İstasyonlarının uygulaması sırasında hedef dışı canlıların temasını engelleyecek, fare ve sıçanların tüketiminin daha kolay olmasını sağlayacak alanları seçiniz.
2. Yem istasyonu, çocuklar ve hedef dışı canlılar tarafından açılmaya karşı korumalı ve içerisinde yemin dış etmenlerden koruyacak dayanıklılıkta olmalıdır.
3. Yem istasyonlarının yerleştirileceği en iyi alanlar; kemirilmiş alanlar, kemirgen dışkılarının görüldüğü yerler, asma tavanlar ve insan aktivitesinin az olduğu karanlık ve kuytu bölgelerdir.
4. Zararlı tespit edilen uygun alanlara yem istasyonları yerleştirilmelidir.
5. 2-3 gün aralıklarla yem istasyonlarını/uygulama yapılan yerleri kontrol ederek, yemleri biten istasyonlar yeni istasyon ile değiştirilmelidir.
6. Sıçanların izleri kayboluncaya kadar uygulamaya devam edin.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, ELDİVEN, GÖZLÜK VE KORUYUCU ELBİSE KULLANINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Antidotu ve Gerekli Bilgiler:

Bu ürün antikoagulan maddeler içerir. Spesifik antidotu K vitamindir. Antidot, tıbbi gözetim altında yapılmalıdır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) 114 NO'LU TELEFONU ARAYINIZ.